



Maag-darmziekten

Over het algemeen moet antibioticabehandeling gereserveerd worden voor dieren met tekenen van sepsis (tachycardie, tachypneu, hypo- of hyperthermie, leukocytose of neutropenie met linksverschuiving, verhoogd bilirubine, hypoglykemie, septische shock) of in gevallen van aanhechtende invasieve *Escherichia coli* (AIEC) geassocieerde granulomateuze colitis bij vatbare rassen (zoals Boxers en Franse Bulldogs).

Het gebruik van antibiotica voor acute (zowel hemorrhagische als niet-hemorrhagische) diarree en chronische diarree wordt niet aangeraden en moet vermeden worden. Het gebruik van metronidazol bij honden of katten met vermoedelijke besmetting met *Giardia* spp. wordt niet aanbevolen.



Chronische inflammatoire aandoeningen

Chronische inflammatoire enteropathie (CIE) is een term voor chronische inflammatoire gastro-intestinale aandoeningen die langer dan 3 weken duren en waarbij extragastro-intestinale oorzaken zijn uitgesloten. CIE wordt geclassificeerd op basis van reacties op behandeling pogingen en moet op een bepaalde volgorde worden onderzocht of uitgesloten.

Order of exclusion:

1. Voedselresponsieve enteropathie (FRE)
2. Immuunonderdrukkende responsieve enteropathie (IRE)
3. Niet-responsieve enteropathie (NRE)

Antibiotic trials are no longer justified in the diagnostic work-up of dogs with chronic diarrhoea because of mounting evidence for their role in selecting for antimicrobial resistant strains of Enterobacteriaceae and long-lasting antibiotic-induced intestinal dysbiosis.

*Uittreksels uit de antibiotica richtlijnen voor behandeling en profylaxe van AniCura.



Wij maken deel uit van
World Antimicrobial Awareness Week
om antimicrobiële resistentie te voorkomen.

